



## NOTA TÉCNICA RÁPIDA Nº 1142

### NOTAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: Nº 94, 247, 264, 604, 1029, 1044, 1142

**Solicitante:** 02ª Vara Cível da Comarca de Baturité

**Número do processo:** 3000343-50.2023.8.06.0048

**Data:** 07/12/2023

Medicamento	X
Material	
Procedimento	X
Cobertura	

## NOTA TÉCNICA RÁPIDA

### 1) Tema:

Trata-se de NT Rápida para avaliação do uso de bevacizumabe (AVASTIN) para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

### 2) Referência de NT anterior compatível:

A presente NT complementar se baseia integralmente nas Notas Técnicas Nº 247, 604, 1029, 1044 e 1142

Por se tratar de caso semelhante, de mesma indicação e mesmo tratamento proposto, foi optado por NT complementar e respostas baseadas na mesma.

Fora indicado ao paciente em questão a indicação de ao menos 3(três) doses de antiangiogênicos (bevacizumabe) para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI). A evidência atual é robusta e foi tratada nas NTs acima.

Vale salientar a cotação da CONITEC para o custo-efetividade das duas medicações:

*Pelo exposto, a CONITEC, em sua 40ª reunião ordinária, posicionou-se desfavoravelmente à incorporação no SUS do ranibizumabe para edema macular diabético, recomendando favoravelmente*



*a incorporação do bevacizumabe para essa indicação. Considerou-se que o ranibizumabe é eficaz e seguro, porém se equipara em eficácia e segurança ao bevacizumabe, o qual representa a alternativa de tratamento mais custo-efetiva*

Vale salientar que os laudos anexados neste processo datam de novembro de 2021 e se faz imprescindível nova avaliação do médico assistente para definição da manutenção da conduta.

### **3) Conclusões:**

O antiangiogênico bevacizumabe apresenta-se como agente de eficácia semelhante no tratamento da degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

O tratamento em questão está bem estabelecido na literatura, como indicado em questão, após 3 (três) sessões, o paciente deverá ser submetido a nova avaliação, em caso de resposta, poder-se-á submeter às demais sessões.

O tratamento em questão está presente na rede pública de saúde.